

# โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเชื้อ: รูปร่างคล้ายกระสุนปืน ถูกทำลายได้ง่าย เมื่อถูกควา น ความแห้ง แสงแดด ยาม้าเชื้อฯ



คลอริน แอลกอฮอล์ กรด หรือ ต่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ๔ ลิง ชะนี กระรอก กระแต เลือ หมู ต่างดาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมา (96% ของจำนวนที่พบเชื้อ ห้องปฏิบัติการ) รองลงมา คือ แมว

**การติดต่อ** โดยกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ช่วน เลี้ย น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือท บาดแผล

**ระยะฟักตัวในสุนัข** 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้น บริเวณที่ได้รับเชื้อ ความรุนแรงของเชื้อ ประมาณ 2-6 สัปดาห์

**อาการในสุนัข** มี 2 ชนิด คือ ชนิดซึม และ ชนิดดุร้าย



## จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด



**1. ล้างแผล**  
ล้างแผลด้วยสบู่ หลาย ๆ ครั้ง เพื่อล้างเชื้อ ออกจากบาดแผลถ้ามีเลือด

ออกควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเดิน แผล เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายไป



**2. ใส่ยา**  
ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตา ดิน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70 %

จะช่วยฆ่าเชื้อ อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุน ลง ในแผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้าจำเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน ถ้าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บหลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว้



**3. กักหมา**  
กักสัตว์ที่กัดไว้ดี อย่างน้อย 15 วัน โดยให้น้ำ และอาหารตามปกติ

อย่าฆ่าสัตว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์เ ุร้ายกัดคนหรือ สัตว์อื่นหรือไม่สามารถกักสัตว์ ก้าสัตว์หนีหายไป ให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุ



**4. ทาหมอ**  
รีบไปหาแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันที เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

อย่ารอจนสัตว์ ที่กัด เมื่อสัตว์ตายรีบตัดหัวส่ง สุนัขบ้า

## จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

เมื่อสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรกักขั ปลอดภัย และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ไม่ควร ทำลายสัตว์โดยไม่จำเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง ซึ่ง ตรวจพบเชื้อได้ง่าย แะ ในการส่งซากควรส่งให้ เร็วที่สุดโดยปฏิบัติอย่า เรื่องความสะอาด ระลึกไว้เสมอว่า สัตว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงควร สวมถุงมือขณะเก็บซาก และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บ ซาก ควรส่งเฉพาะส่วนหัว



### 1. ตัดหัวสัตว์

ตัดหัวสัตว์ตรงคอต่อ ใส่ถุงพลาสติกซ้อน หลาย ๆ ชั้น รัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงมี ทุกครั้งที่ตัด ถ้าเป็นแมวหรือสัตว์ ตัวเล็กสามารถส่งไป



### 2. แช่แข็ง

ใส่กระติกหรือภาชนะ เช่น กล่องโฟม แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็น ตลอดเวลา แล้วใส่น้ำแข็งให้เย็น ตลอดเวลา



### 3. ประวัต

ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าของสัตว์ และผู้ถูกกัด

ในกรณีส่งซากควรส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์ จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ

ควาไปพบสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเมื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัตว์ เช่น ชนิดสัตว์ สี เพศ พันธุ์ อายุ สถานที่ถูกกัด เมื่อวานมาตทการป้องกันและควบคุมโรคทั่วไป

# จะป้องกันสุนัขบ้าได้อย่างไร



**1. ไม่ปล่อยสุนัขพเนจร**  
สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เชื้อโรคที่สำคัญ อาจกัดผ่านไปตามหรือกัดสุนัขอื่นที่

โรคพิษสุนัขบ้าได้



**2. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี** สุนัขจรเป็นหน้าที่ของเจ้าของ (ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 2535) ที่จะต่อ

สุนัขอายุระหว่าง 2-4 เดือน ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดซ้ำตามที่สั



**3. อย่าให้มีลูกมาก** โดยการทำหมันสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย หรือฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขตัวเมีย ไม่ให้มีลูกมากเกินไป ไม่อาจเลี้ยงดูได้ต้องนำไป

กลายเป็นสุนัขจรจัดและเป็นปัญหาของสังคม



# เรื่องน่ารู้.....

- สุนัขตัวผู้เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าตัวเมีย
- สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุร้ายมากกว่าแบบซึม
- กว่า 90 % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษจาก การไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับกั สัตว์กัด
- ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการถูก กัด หรือสุนัขที่ เจ้าของของแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า
- สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอายุ มาก
- ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าผู้หญิง
- การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหาอาหาร แต่ไม่นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดไม่ให้มีลูก เป็นการเพิ่มจำนวน และแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า
- ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัข บ้าได้เช่นเดียวกับสุนัขโต



# โรคพิษสุนัขบ้า

เราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ

ของประชาชนในตำบลโนนค้อ



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร. 045-251956

แจ้งสัตว์แพทย์กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีที่พบเห็นสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

